

## Le cas COVID+ suspect/confirmé

### 1/ S'il s'agit d'un professionnel

- Dépistage selon recommandations
- Arrêt de travail selon les recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique (16/03/2020 – Avis relatif aux critères cliniques de sortie d'isolement des patients ayant été infectés par le SARS-COV2 – Paragraphe 3, page 7-8).

### 2/ S'il s'agit d'un patient

- Chambre seule
- Mesures barrières COVID+ selon les recommandations SF2H en vigueur et protocole de l'établissement
- Dépistage selon recommandations et circuit défini

## Les contacts

*Définition d'un contact : personne qui, à partir de 24 heures précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé :*

- *pour les patients : a partagé la même chambre, et/ou a eu un contact direct avec le cas en face à face à moins d'un mètre ou pendant plus de 15 minutes,*
- *pour les professionnels : a prodigué des soins à un cas confirmé ou a eu un contact direct avec le cas en face à face à moins d'un mètre ou pendant plus de 15 minutes, en l'absence des moyens de protection adéquats*

### 1/ Les professionnels contact

- Respect strict des précautions standard, dont hygiène des mains :
  - o SHA ou, si mains souillées/mouillées, lavage des mains (eau et savon) :
    - A l'entrée et à la sortie de chaque chambre
    - Avant et après tout soin/contact
- Port du masque chirurgical toute la journée pendant 14 jours à compter du dernier jour d'exposition
  - o SHA avant de mettre le masque et après son retrait
  - o A changer toutes les 4 heures et chaque fois qu'il est enlevé
  - o Il peut être maintenu en place dans le cas de soins à plusieurs patients **à condition de ne pas le toucher et de réaliser une friction avec SHA entre 2 patients**
- Surveillance de la température du professionnel 2 fois par jour
- Identification précoce de tout symptôme : éviction professionnelle pour tout symptôme même de faible intensité, avec respect des mesures de confinement, dépistage selon recommandations et circuit défini.

### 2/ Les patients contact non symptomatiques

- Prise en charge des patients en appliquant les précautions standard et les précautions gouttelettes : port d'un masque chirurgical dès l'entrée de la chambre
- Dès les premiers symptômes, même minimes : mise en place des mesures barrières COVID+, dépistage en fonction des recommandations.
- Si retour à domicile : respect des mesures de confinement, surveillance des symptômes 14 jours
- Si transfert dans autre établissement : patient accueilli en chambre seule et PCG 14 jours

#### **Note :**

- **prévoir une possibilité de regroupement ou sectorisation si 2 cas ou plus**