

ATTENTION



***Gants : Mal utilisés, ils sont une fausse sécurité !
Le coronavirus survit sur les gants, il ne survit pas à
une friction hydro-alcoolique (FHA) sur les mains !***

***Les gants UU non stériles de soins sont à utiliser
uniquement en cas de risque de contact avec les
liquides biologiques*, la peau lésée, les muqueuses
Faire une FHA avant le port et après le retrait***

****selles, urines (change, manipulation de linge souillé...), sécrétions
respiratoires (aspiration...), sang (bilan biologique...) ...***

Gants de soins non stériles : pour un juste usage

Je mets des gants



Risque d'exposition avec les liquides biologiques

Urines, selles, sang, ascite, crachats, liquide pleural...

- Change
- Prélèvement sanguin
- Pose d'une voie veineuse périphérique
- Injections IM et SC
- Ponction
- Aspiration
- Elimination des déchets
- Kinésithérapie respiratoire
- Manipulation d'échantillons biologiques
- Transport du plat-bassin au lave-bassin
- Vidange du sac collecteur à urines
- Élimination des protections...

Contact avec des muqueuses

- Soin de bouche
- Toilette intime
- Examen buccal, gynécologique, rectal...

Contact avec une peau lésée

- Lésions cutanées
- Escarres...

Précautions complémentaires

- *Clostridium difficile*
- Gale

Mettre des gants lors des soins si les mains du soignant sont lésées

1 soin = 1 paire de gants

Je ne mets pas de gants



Contact avec la peau saine

- Prise de la tension et de la température
- Examen clinique
- ECG, EEG
- Toilette du patient (hors muqueuses)
- Habillage du patient...

Kinésithérapie fonctionnelle

Examen radiologique

Transfert du patient

- Brancardage
- Transport
- Manutention...

Précautions complémentaires contact « BMR / BHRé »

Soins des yeux, des oreilles en l'absence d'écoulement

Autres situations

- Réfection du lit
- Pose et dépose des plateaux repas
- Aide à la prise des repas
- Distribution de médicaments
- Changement d'une seringue électrique...

Rappels sur les bonnes pratiques du port des gants de soins

- Réaliser une friction hydro-alcoolique avant de prendre les gants et après leur retrait
- Mettre les gants juste avant le geste
- Retirer les gants et les jeter immédiatement après la fin du geste
- Changer de gants entre deux patients, pour un même patient lorsqu'on passe d'un site contaminé à un site propre
- Ne pas superposer deux paires de gants
- Ne pas désinfecter les gants avec PHA
- Pas de gants dans les poches